

Osmoderma eremita



Description de l'espèce

Ce coléoptère d'aspect massif est la plus grande cétoine de France avec une taille atteignant 30 mm. Son corps brun noir est rehaussé de reflets cuivrés et parfois roux. Il est entièrement recouvert d'une ponctuation grossière et l'on reconnaît les femelles à leurs tibias antérieurs plus fortement denticulés.

Indices de présence

L'adulte, qui vole lourdement lors des fins de journées chaudes d'août, se caractérise par des mœurs discrètes. La larve passe au moins deux années dans le terreau des arbres creux où elle est difficile à repérer. Observé dans différentes essences, il semble préférer les vieux Saules et Châtaigniers. Ce xylophage ne peut être considéré comme un parasite dans le sens où il n'habite que des arbres creux âgés renfermant un volume important de terreau.

Répartition régionale et populations

Les observations postérieures à 1950 en région Centre se localisent essentiellement en marge nord. On est ici en contact avec la population s'étendant en Sarthe et dans l'Orne.

Deux autres observations concernent le bocage à l'ouest de Bourges et une autre les landes de Touraine, en limite du Maine-et-Loire. Ces observations montrent que l'aire de présence de l'espèce est très lacunaire. Elle est à rechercher également en Sologne.

Habitats et mesures de gestion favorables

Le maintien de groupes ou réseaux des vieux arbres (Châtaigniers et Saules) montrant des cavités est nécessaire à sa survie.

Le Barbot ne s'éloigne guère, même à l'âge adulte, de l'arbre qui a vu son développement.

Le bocage (sous réserve de conserver les vieux arbres), les alignements de vieux saules proches des cours d'eau, les lisières composites et les massifs satellites des grandes unités forestières sont les milieux à respecter et à gérer préférentiellement pour conserver cette espèce.

