



Chênaies à Chêne tauzin de Sologne



©BS

1



©FO


2

- (1) Chênaie à Chêne tauzin en faciès humide.
(2) Chênaie à Chêne tauzin en faciès sec.

Description de l'habitat :

Il s'agit de peuplements forestiers généralement clairs, dominés par le Chêne tauzin (qui peut même constituer un peuplement pur) auquel peut s'associer du Chêne pédonculé voire sessile, et parfois du bouleau.

Le Chêne tauzin est une espèce pionnière* particulièrement bien adaptée à l'hétérogénéité des sols solognots en zones forestières. On peut ainsi retrouver ces stations dans différents contextes écologiques. Selon l'acidité, le degré d'engorgement du sol ou encore le degré d'évolution du peuplement, la physionomie du boisement peut varier. Il peut se rencontrer sous forme de bouquets mêlés à des landes* sèches acides, de taillis purs associés à des tapis de Canche flexueuse sur sol acide, jusqu'à former des taillis-sous-futaie de Chênes pédonculés. Les strates arbustive et herbacée varient également selon les conditions propres à la station.



Menaces et préconisations de gestion :

Le maintien durable du Chêne tauzin est potentiellement facile à assurer. Cependant, la dynamique pionnière de cette essence implique une attention particulière à porter sur la conservation des gros semenciers âgés en limite de parcelles, en clairière ou en bouquets épars sur les landes* pour assurer les stocks de glands. Dans les cas de taillis purs ou mélangés, il faut poursuivre la conduite en taillis en prenant soin de toujours conserver les grands sujets lors des coupes. Lorsque le Chêne tauzin est en contexte de landes sèches, il faut conserver cette mosaïque d'habitats, en gardant des espaces ouverts qui seront favorables à son maintien (en veillant à ce que le Chêne tauzin ne ferme pas la lande sèche qu'il colonise).

Risques de confusion :

Cet habitat varie beaucoup d'aspect selon le niveau trophique, l'acidité, et l'engorgement du sol, mais aussi en fonction du degré d'évolution. A des stades de maturation avancés, cet habitat tend vers une chênaie sessiliflore classique. La dominance du Chêne tauzin dans les chênaies mélangées est la première condition pour que l'habitat soit reconnu au sens de la directive.

Espèces végétales typiques :

-  Chêne tauzin (*Quercus pyrenaica*) ①
-  Bruyère cendrée (*Erica cinerea*) ②
- Canche flexueuse (*Deschampsia flexuosa*)
- Germandrée scorodaine (*Teucrium scorodonia*)
- Molinie bleue (*Molinia caerulea*)
- Chèvrefeuille des bois (*Lonicera periclymenum*)
- Brande (*Erica scoparia*)
- Bouleau verruqueux (*Betula pendula*)
- Callune (*Calluna vulgaris*)
- Carex à pilules (*Carex pilulifera*)
- Chêne pédonculé (*Quercus robur*)
- Potentille tormentille (*Potentilla erecta*)
- Véronique officinale (*Veronica officinalis*)
- Houlque molle (*Holcus mollis*)



Espèces remarquables de la faune associées à cet habitat :

-  Coroebe ondé (*Coroebus undatus*) ①
-  Pic mar (*Dendrocopus medius*) ②



Relation avec l'Homme :

Le Chêne tauzin est réputé comme un excellent combustible, produisant un charbon de bois estimé. La haute valeur nutritive de ses glands lui confère également un intérêt cynégétique.

Informations complémentaires :

Phytosociologie : alliance du *Quercenion robori-pyrenaicae*.

Cahiers d'habitats tome 1, Habitats forestiers, volume 1 Chênaies à Chênes tauzin de Sologne.