



## Molinaies landicoles humides




- (1) Molinaie landicole (grande densité de touradons\* de Molinie).
- (2) Molinaie landicole en cours de fermeture par les ligneux.
- (3) Faciès de molinaie landicole assez pauvre en espèces végétales.

### Description de l'habitat :

Cet habitat correspond à d'anciennes prairies\* de fauche à Jonc à tépales aigus sur sol humide et imperméable composée d'une végétation dominée par de la Molinie. Cette dernière forme un tapis discontinu, et parfois des touradons\* dans les prairies\* abandonnées depuis longtemps. La strate herbacée, souvent disséminée entre les touffes de Molinie, se caractérise par la présence de nombreuses plantes à fleurs adaptées aux conditions hydriques (Scorsonère des prés, Carvi verticillé, Cirse découpé...).

L'engorgement, voire la submersion du milieu, en hiver et au printemps, alternant avec un dessèchement l'été, est une condition importante à son maintien et un bon critère d'identification. Pour être retenues au titre de la directive « Habitats », ces molinaies doivent avoir été fauchées dans le passé, ou subir une fauche occasionnelle, ou encore être soumise au pâturage extensif\*.



### Menaces et préconisations de gestion :









Les bonnes pratiques de gestion doivent conduire à une diversification des espèces présentes dans ces molinaies.

Les préconisations de gestion sont identiques à celles des prairies à Jonc à tépales aigus. Il ne faut pas drainer et ne pas amender. Il ne faut pas amener de matériaux d'empierrement calcaires près des stations et minimiser les feux. Il faut également exclure les travaux mécaniques en période de haut niveau de la nappe. Deux options sont envisageables en ce qui concerne l'entretien, le pâturage extensif\* avec des bovins ou des ovins rustiques, ou la fauche tardive le cas échéant (après coupe des ligneux), au moins triennale, avec exportation de la matière végétale.




### Risques de confusion :



Une confusion est possible avec des tapis de Molinie consécutifs à des abandons de sylviculture. C'est pourquoi un historique et un relevé floristique de la parcelle est important pour pouvoir identifier avec certitude l'habitat d'intérêt communautaire.

**Espèces végétales typiques :**

-  Molinie bleue (*Molinia caerulea*) ①
-  Cirse découpé (*Cirsium dissectum*) ZNIEFF ②
-  Scorsonère des prés (*Scorzonera humilis*) ③
-  Carvi verticillé (*Carum verticillatum*) ZNIEFF
-  Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*) ZNIEFF
-  Jonc à tépales aigus (*Juncus acutiflorus*)
-  Callune commune (*Calluna vulgaris*)
-  Peucedan des marais (*Peucedanum palustre*)

**Espèces remarquables de la faune associées à cet habitat :**

-  Miroir (*Heteropterus morpheus*) ①
-  Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) ②
-  Cuivré des marais (*Lycaena dispar*)

**Relation avec l'Homme :**

Certaines de ces prairies\*, selon le degré de présence de la Molinie, sont encore fauchées pour le foin (de mauvaise qualité) ou la production de litière, mais ce type de pratique est de plus en plus abandonné. Les moliniaies landicoles peuvent également présenter un intérêt cynégétique en tant que pâturage à cervidés.

**Informations complémentaires :**

Phytosociologie : alliance du *Juncion acutiflori*.

Cahiers d'habitats tome 4, Habitats agropastoraux, Volume 2, cf. Moliniaies hygrophiles acidiphiles atlantiques.