

Eriogaster catax



© I.E.-A. (Collection Muséum d'Histoire Naturelle d'Orléans).

Description de l'espèce

La Laineuse du Prunellier est un petit papillon de nuit de couleur fauve à beige, dont l'uniformité n'est rompue que par la présence d'une tache blanche cernée de noir au milieu des ailes antérieures, en face supérieure. Dès le mois de mai, ses chenilles se regroupent dans une même toile et se nourrissent des feuilles de Chêne, Bouleau, Prunellier, Aubépine et Épine-vinette.

Biologie

Les adultes de cette espèce nocturne et forestière sont difficilement observables. La présence de la Laineuse est cependant révélée par les nids de toile abritant les chenilles.

Répartition régionale et populations

La période de vol tardive des adultes (octobre-novembre) est une des raisons de la méconnaissance de la biologie de l'espèce et rend plus difficile son observation, induisant vraisemblablement une sous-estimation de sa répartition. En région Centre, la Laineuse a été observée au cours des dix dernières années uniquement dans quelques localités du Loiret et du Loir-et-Cher, toujours en faible densité.

Habitats et mesures de gestion favorables

L'espèce fréquente les forêts, les lisières et les haies où sont présents les arbres nourriciers des chenilles. Bien que sa biologie soit encore peu connue, les méthodes sylvicoles modernes (enrésinement, introduction d'espèces exotiques, arrachage des Aubépines) jouent manifestement un rôle néfaste sur son maintien. La destruction des haies en zones agricoles lui est également préjudiciable.

L'adaptation des pratiques sylvicoles constitue de ce fait une action favorable à l'espèce, mais la réalisation d'études sur l'écologie de la Laineuse du Prunellier devrait permettre la mise en lumière d'autres causes de son déclin.

